



Bartoszyce, dnia 30 września 2024r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W BARTOSZYCACH

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
WPLYNEŁO

31.10.2024

L.Dz. 15945.2024
Podpis: [signature]

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

Nasz znak: PIW.Z.ZZ.4001.2.10.2024

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

W związku z niekorzystną sytuacją epizootyczną w odniesieniu do grypy ptaków i potwierdzeniem w dniu 23 października 2024 r. trzydziestego pierwszego (w tym roku) ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie przypadków znalezienia zwłok dzikich ptaków gatunków docelowych (zgodnych z załączonym wykazem gatunków) w celu objęcia ich badaniami w kierunku występowania ptasiej grypy.

Zgodnie z „Krajowym programem mającym na celu wykrycie zakażeń wirusami wywołującymi gripę ptaków (Avian influenza) u drobiu i dzikich ptaków” na 2024 r. stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz.U. 2024, poz. 553) pobieranie próbek i ich badanie laboratoryjne prowadzi się w odniesieniu do dzikich ptaków, które zostały:

- 1) znalezione martwe;
- 2) znalezione ranne lub chore;
- 3) upolowane i wykazywały objawy kliniczne wskazujące na podejrzenie zakażenia wirusem HPAI.

Wykaz gatunków dzikich ptaków, od których pobiera się próbki do badań laboratoryjnych na obecność wirusa grypy ptaków (gatunki docelowe) został określony w ust 13 ww. załącznika do rozporządzenia.

Po pozytywnej weryfikacji przeprowadzonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach poprawności przekazanego zgłoszenia oraz ocenie, czy dostarczone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach zwłoki znalezionej dzikiego ptaka z gatunku docelowego są przydatne do badań laboratoryjnych, Powiatowy Lekarz Weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, dyrektorowi parku narodowego, zarządcy lasów miejskich lub kierownikowi instytucji zaangażowanej we współpracę z Inspekcją Weterynaryjną kwotę 200 zł za zgłoszenie znalezienia takiego ptaka i dostarczenie jego zwłok organom Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z właściwością miejscową tych organów.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Bema 33, 11-200 Bartoszyce

tel.: (89) 764-24-71, e-mail: biuro@bartoszyce.piw.gov.pl, www.bip.bartoszyce.piw.gov.pl

Jeżeli w danym miejscu znaleziono więcej niż jednego dzikiego ptaka z gatunku docelowego, do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszychach można dostarczyć tylko jednego takiego ptaka. Jeżeli w danym miejscu znaleziono ptaki dzikie z dwóch lub więcej gatunków docelowych do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszychach można dostarczyć po jednej sztuce takiego ptaka z każdego gatunku docelowego.

Optymalnym i rekomendowanym sposobem dokonywania zgłoszeń przypadków padnięć wśród ptaków dzikich jest korzystanie z aplikacji ZIMP-Zintegrowany Interfejs Monitoringu Ptaków, poprzez wpisanie w wyszukiwarkę internetową słowa ZIMP.

Przy zgłoszeniach osobistych zakres wymaganych informacji: data, godzina znalezienia zwłok, miejscowość znalezienia wraz z koordynatami miejsca, dane osoby która znalazła (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), gatunek znalezionej dzikiego ptaka.

Ptaki należy dostarczać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszychach ul. Bema 33, 11-200 Bartoszyce, w godzinach pracy poniedziałek- piątek 07-15.

Zgłoszenie telefoniczne biuro 89 764 24 71

Powiatowy Lekarz Weterynarii Teresa Kacprzak nr tel. 795 562 282,

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Katarzyna Strzelczyk nr tel. 886 686 272.

Z poważaniem

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W BARTOSZYCACH

lek. wet. Teresa Bema Kacprzak

Załącznik:

1. Wykaz docelowych gatunków dzikich ptaków od których pobiera się próbki do badań laboratoryjnych



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Bema 33, 11-200 Bartoszyce

tel.: (89) 764-24-71, e-mail: bartoszyce.piw@wetgiw.gov.pl, www.bip.bartoszyce.piw.gov.pl

13. Nadzór bierny w kierunku HPAI u dzikich ptaków

13.1. Docelowe populacje dzikich ptaków

Wykaz gatunków dzikich ptaków, od których pobiera się próbki do badań laboratoryjnych na obecność wirusa grypy ptaków (gatunki docelowe)*

Rodzina	Gatunek
Kaczki, gęsi i łabędzie (<i>Anatidae</i>)	czernica (<i>Aythya fuligula</i>)
	ogorzałka (<i>Aythya marila</i>)
	głowienka (<i>Aythya ferina</i>)
	hełmiatka (<i>Netta rufina</i>)
	rożeniec (<i>Anas acuta</i>)
	świstun (<i>Mareca penelope</i>)
	cyranka (<i>Anas querquedula</i>)
	plaskonos (<i>Spatula clypeata</i>)
	krakwa (<i>Mareca strepera</i>)
	krzyżówka (<i>Anas platyrhynchos</i>)
	cyraneczka (<i>Anas crecca</i>)
	nurogęś (<i>Mergus merganser</i>)
	szlachar (<i>Mergus serrator</i>)
	gągoł (<i>Bucephala clangula</i>)
	bielaczek (<i>Mergellus albellus</i>)
	edredon (<i>Somateria mollissima</i>)
	uhla (<i>Melanitta fusca</i>)
	markaczka (<i>Melanitta nigra</i>)
	łodówka (<i>Clangula hyemalis</i>)
	ohar (<i>Tadorna tadorna</i>)
	gęsiówka egipska (<i>Alopochen aegyptiacus</i>)
	gęś mała (<i>Anser erythropus</i>)
	gęgawa (<i>Anser anser</i>)
	gęś zbożowa (<i>Anser fabalis</i>)
	gęś tundrowa (<i>Anser rossicus</i>)
	bernikla kanadyjska (<i>Branta canadensis</i>)
	gęś krótkodzioba (<i>Anser brachyrhynchus</i>)
	bernikla białolica (<i>Branta leucopsis</i>)
	bernikla obrożna (<i>Branta bernicla</i>)
	gęś białoczelna (<i>Anser albifrons</i>)
	łabędź czarnodzioby (<i>Cygnus columbianus</i>)
	łabędź krzykliwy (<i>Cygnus cygnus</i>)
	łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>)
Perkozowe (<i>Podicipedidae</i>)	zausznik (<i>Podiceps nigricollis</i>)
	perkoz rdzawoszyi (<i>Podiceps ruficollis</i>)
	perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>)
	perkozek (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)
Bociany (<i>Ciconiidae</i>)	bocian biały (<i>Ciconia ciconia</i>)

Czaplowate (<i>Ardeidae</i>)	bąk (<i>Botaurus stellaris</i>)
	czapla nadobna (<i>Egretta garzetta</i>)
	czapla biała (<i>Egretta alba</i>)
	czapla siwa (<i>Ardea cinerea</i>)
Kormorany (<i>Phalacrocoracidae</i>)	kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)
Ptaki drapieżne (<i>Accipitridae</i> , <i>Falconidae</i> , <i>Strigidae</i>)	bielik (<i>Haliaeetus albicilla</i>)
	rybołów (<i>Pandion haliaeetus</i>)
	blotniak stawowy (<i>Circus aeruginosus</i>)
	myszolów włochaty (<i>Buteo lagopus</i>)
	myszolów (<i>Buteo buteo</i>)
	pustułka (<i>Falco tinnunculus</i>)
	sokół wędrowny (<i>Falco peregrinus</i>)
	jastrząb (<i>Accipiter gentilis</i>)
	krogulec (<i>Accipiter nisus</i>)
	uszatka (<i>Asio otus</i>)
	puszczyk (<i>Strix aluco</i>)
	puchacz (<i>Bubo bubo</i>)
Łyski, derkacze i chruściele (<i>Rallidae</i>)	wodnik (<i>Rallus aquaticus</i>)
	kokoszka (<i>Gallinula chloropus</i>)
	łyśka (<i>Fulica atra</i>)
Bekasowate (<i>Scolopacidae</i>)	samotnik (<i>Tringa ochropus</i>)
	ostrzygojad (<i>Haematopus ostralegus</i>)
	sieweczka obrożna (<i>Charadrius hiaticula</i>)
	sieweczka rzeczna (<i>Charadrius dubius</i>)
Mewy, rybitwy i podobne (<i>Laridae</i>)	mewa siodłata (<i>Larus marinus</i>)
	mewa srebrzysta (<i>Larus argentatus</i>)
	mewa białogłowa (<i>Larus cachinnans</i>)
	mewa czarnogłowa (<i>Ichthyaeetus melanocephalus</i>)
	mewa siwa (<i>Larus canis</i>)
	śmieszka (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)
	rybitwa rzeczna (<i>Sterna hirundo</i>)
	rybitwa białoczelna (<i>Sternula albifrons</i>)
	rybitwa czubata (<i>Thalasseus sandvicensis</i>)
Krurowate (<i>Corvidae</i>)	sroka (<i>Pica pica</i>)
	kawka (<i>Coloeus monedula</i>)
	gawron (<i>Corvus frugilegus</i>)
	wrona siwa (<i>Corvus cornix</i>)
	kruk (<i>Corvus corax</i>)
Drozdzy (<i>Turdidae</i>)	kwiczoł (<i>Turdus pilaris</i>)
	kos (<i>Turdus merula</i>)
	śpiewak (<i>Turdus philomelos</i>)
Kurowate (<i>Phasianidae</i>)	bażant (<i>Phasianus colchicus</i>)
Gołębiowate (<i>Columbidae</i>)	grzywacz (<i>Columba palumbus</i>)
	sierpówka (<i>Streptopelia decaocto</i>)

* Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – 2023 r.